

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ  
ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД  
P-109-201/02.05.2018 г.  
НА РЕКТОРА НА МУ - ВАРНА  
СТАНОВИЩЕ**

**От**

**проф. д-р Асен Николов, д.м. - Ръководител катедра по Акушерство и  
гинекология към МУ София, Началник родилна клиника в СБАЛАГ**

**„Майчин дом“ София**

**върху представения за защита труд на д-р Валентин Кирилов ИВАНОВ,**

**акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД- София “**

**ЕФЕКТИВНОСТ НА ХИСТЕРОСКОПСКАТА РЕЗЕКЦИЯ НА  
ПОЛИПИ НА ЕНДОМЕТРИУМА И СУБМУКОЗНИ МИОМНИ**

**ВЪЗЛИ“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”**

**Кратки биографични данни и учебно-преподавателска дейност**

Д-р Иванов е роден през 1962г. Завършил медицина през 1993г. във ВМИ- София, като през 2002г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. От 1998г. Д-р Иванов работи като акушеро-гинеколог в ПСАГБАЛ „Св. София“ - София, от 2012г. до 2017г. е завеждащ операционен блок към болницата. От месец октомври 2017г. до момента работи в СБАЛАГ „Майчин дом“ – София, Трета Гинекологична клиника. Той е член на БЛС, БДАГ и участва активно в провеждането на научните форуми на тези организации.

Дисертационният труд на д-р Валентин Иванов представлява текст от 139 страници. В него има включени 22 таблици, 13 фигури и 29 броя снимков материал. Приложени са и две схеми с клиничен алгоритъм. Книгописът притежава общо 201 източника, 198 на латиница и три на кирилица.

Миомната болест и полипите на ендометриума са един изключително актуален проблем за българското здравеопазване, поради засягане на жените във фертилна и менопаузална възраст. У нас все още кюретажът е основен метод за третиране на заболявания във вътрешната кухина. Опитът в областта на ендоскопските техники все още е ограничен главно в някои университетски болници и желанието на д-р Иванов да се заеме с такова проучване и съответната му публична защита трябва да бъде оценено категорично положително.

**Литературният обзор** е добре структуриран и показва, че дисертантът е проучил задълбочено голям брой съвременни литературни източници. Обзорът притежава добра познавателна стойност.

**Целта на проучването** е да се направи обстоен клиничен и хистоморфологичен анализ на хистероскопската резекция на полипи на ендометриума и субмукозни миомни възли.

Основните задачи са ясно формулирани и произтичат от поставената цел:

1. Да се анализира краткосрочната и дългосрочна ефективност на хистероскопската резекция на ендометриални полипи и субмукозни миомни възли.
2. Да сравним хистероскопската полипектомия със сляпата биопсия (куретаж). Да установим риска от злокачественост при полипите и създадем алгоритъм за поведение при пациентки със злокачествени полипи.
3. Да се оцени влиянието на параметрите: големина и локализация на субмукозните миомни възли върху резултатите от хистерорезекцията.
4. Да се извърши обстоен анализ на оперативните усложнения при хистерорезекции. Да се установи честотата на рецидивите.
5. Да се анализира групата на пациентки с инфертилитет, полипи и миоми и резултатите след хистерорезекция като се

изчисли процента на реализирани бременности. 6. Да се изготви алгоритъм за поведение при пациентки с ендометриални полипи и субмукозни миомни възли.

## **Материал и методи**

Проведеното проучване е с ретроспективен и проспективен характер. За периода 2010-2016 г. в ПСАГБАЛ „Св. София“ са извършени 849 оперативни хистероскопии, разпределени в 3 групи: Ендометриални полипи, Субмукозни миомни възли и други. Автора е разделил ендометриалните полипи на две групи: - . Полипи на краче (pedunculum) са диагностицирани при 302 пациентки. - Полипи на широка основа (sessile) са открити при 244 пациентки. Д-р Иванов разпределя пациентките на три групи, според видовете оплаквания: - пациентките с abnormalno генитално кървене -345 - пациентки със стерилитет - 134 - пациентките без оплаквания, при които са открити полипи са 28. При всички пациентки е извършено дългосрочно проследяване: съответно 56,4 и 53,4 месеца.

Методи използвани в дисертационния труд: Диагностични (анамнеза, гинекологичен преглед) При всички 849 пациентки е извършено TVUS за диагностициране на ендометриален полип и субмукозен миомен възел.

Диагностична хистероскопия Основното преимущество на хистероскопията е способността да се визуализира и евентуарно последващо отстраняване на полипа. В своята разработка автора описва усложнения (белодробен оток) вследствие на оперативна дейност с монополярен резектоскоп. Д-р Иванов представя предимствата на биполярен резектоскоп, който използва за дистензия физиологичен разтвор (0,9%NaCl), което намалява значително риска от усложнения, както е важна и икономическата целесъобразност.

Биполярната резектоскопия снижава значително оперативното време, поради по-голямата си мощност, ефективност и безопасност.

Считам, че мащаба на изследвания контингент е напълно достатъчен за получаване на достоверни резултати, изводи и заключения.

#### Използвани статистически методи

За обработка на данните, обект на настоящата дисертационна работа, беше използван програмният продукт SPSS 19 и бяха приложени следните анализи:

##### A. Описателна (дескриптивна) статистика

1. Количество променливи – вариационен анализ, включващ средна стойност, стандартно отклонение, минимум, максимум.
2. Качествени променливи – честотен анализ, включващ абсолютни честоти и относителни честоти
3. Графичен анализ

#### Собствени резултати и обсъждане

Дисертантът е систематизирал и разделил собствените си резултати в следните групи:

1. Сравнителен анализ на основните методи за лечение на ендометриалните полипи: диагностична и оперативна хистероскопия, дилатация и кюретаж.

Анализ на риска от злокачествения потенциал на полипите. Изготвяне на алгоритъм за поведение при ендометриални полипи.

2. Анализ на ефикасността на хистерорезекцията на субмукозни миомни възли. Влияние на параметрите: големина, локализация и проникване на възела в миометриума върху резултатите от хистерорезекциите. Изготвяне на алгоритъм за поведение при пациентки със субмукозни миомни възли.

3. Полипи на ендометриума и субмукозни миомни възли, като причина за стерилитет и анализ на резултатите след хистероскопия.

Анализирани са данните на 546 пациентки с ендометриални полипи и 217 случая със субмукозни миомни възли. Проучването е проведено за седем годишен период от януари 2010г. до декември 2016г. в ПСАГБАЛ „Света София“, като включва подложените на оперативно лечение пациентки с ендометриални полипи и субмукозни миомни възли.

В дисертационния си труд д-р Иванов предлага общо **9 ИЗВОДА**.

#### **Изводи:**

1. Оперативната хистероскопия се доказва като най-ефикасното лечение на ендометриалните полипи и поради ниския относителен дял на усложнения в сравнение с класически прилагания кюретаж (сляпа биопсия). Последният не осигурява прецизна диагностика и следва да се извършва по изключение само при обстановка на липсваща апаратура и оперативен опит.

Доказаният по-висок малигнен потенциал на ендометриалните полипи в менопаузата налага те да бъдат задължително отстранявани и подложени на хистоморфологичен анализ, определящ последващото клинично поведение.

3. Степента на трудност на хистерорезекцията на субмукозните миоми основно се определя от големината и анатомичното им разположение в

матката. Големите миомни възли (G2), разположени фундално и по кантовете на матката, са с най-висока оперативна трудност за отстраняване и в определени случаи резекцията може да протече двуетапно. 4.

Хистерорезекцията се характеризира с нисък относителен дял на усложнения. В спектъра на усложненията най-честото е постоперативната метрорагия (2 %) и руптурата на маточната шийка (0,82%). Най-сериозните усложнения се представят чрез маточната перфорация (0,55%) и TUR синдрома (0,23%).

Хистерорезекцията на ендометриалните полипи е свързана с половината от усложненията при отстраняване на субмукозната миоматоза и само с една десета от същите при синехиолизата. С нарастване на оперативния опит на клинициста процентът на усложнения намалява 5. Без да е известен със сигурност механизъмът, по който ендометриалните полипи и субмукозните възли оказват негативно влияние върху стерилитета,resp. инфертитиитета, нашите резултати показват, че при липса на други фактори хистероскопската им резекция увеличава процента на забременяване и износване на бременността. 6. Третирането на израждащи се миомни възли чрез вагинална миомектомия е интервенция, свързана с висок процент усложнения (20%), което представлява значително по-висока честота спрямо тези на установения при хистероскопиите резултат. 7. Алгоритъм за клинично поведение при пациентки с полипи на ендометриума и субмукозни миомни възли. По-важните са свързани с доказването на високата ефективност на оперативната хистероскопия при вътрешно-маточната патология паралелно с ниската честота на типичните усложнения.

Практическите приноси на автора са с оригинална и потвърдителна стойност. Считам за по-съществени тези, свързани с въвеждането на два адаптирани

алгоритма на поведение при жени с ендометриални полипи и субмукозни миомни възли.

1. За първи път у нас се извършва задълбочено проучване върху сериозен клиничен материал в областта на хистероскопската оперативна техника. 2. С практически принос са клиничните и статически доказаните предимства на хистероскопската хирургия при интраутеринната туморна патология в сравнение с радикалните хирургични практики. 3. Установява се, че модифицирането на техниката чрез използване на биполярната хистерорезекция в дистензионна среда от физиологичен разтвор е свързано със значимо намаляване на типичните за оперативната процедура усложнения. 4. Постига се подобряване на репродуктивния потенциал при жените във fertилна възраст при използването на процедурите с минимална оперативна инвазивност. 5. Приносно значение представлява методиката за изследване на пациентки с израждащи се миомни възли, резултатите и препоръките за третиране. 6. Оригинален принос е предложената стратегия за поведение при ендометриални полипи с белези за злокачественост. При увредени пациентки с тежки придружаващи заболявания и противопоказания за радикална хирургическа операция хистерорезекцията с абляция на ендометриума би могла да бъде дефинитивно лечение. 7. С практическа стойност е създаденият алгоритъм за поведение при пациентки с полип на ендометриума и субмукозна миоматоза.

### **Критични бележки**

Препоръчвам по-активна публикационна изява на докторанта.

### **Заключение**

Дисертационния труд на д-р Валентин Кирилов „Ефективност на хистероскопската резекция на полипи на ендометриума и субмукозни миомни възли“ е актуален и отговаря на общоприетите критерии.

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за присъждане на научно-образователна степен “доктор” по научната специалност „Акушерство и гинекология“ на д-р Валентин Кирилов Иванов.

28.05.2018г.

Проф. д-р Асен Николов, д.м.

