





Лечение и управление на лекарствено-индуцираните хазартни разстройства



- Опиоидни антагонисти

Naltrexone

Nalmefene

→ намаляват стимулиращите ефекти от хазарта (опиоидните рецептори участват в сигналните пътища на възнаграждението)

Leung & Cottler, 2009
Ahab & Khazael, 2011
Kabuzek et al., 2014
Jayan, 2015
Goslar et al., 2019
Mestre-Bach & Potenza, 2024

Поради вариациите в ефективността на разглежданите фармакологични агенти, нито един от тях не е утвърден като общоприето средство за терапия на разстройствата, свързани с хазарта.


Фармацевтът е първата линия за ранно разпознаване на импулсивни симптоми. Назревящата реакция може да предизвика тежки социални и функционални последици за пациента.



Поради вариациите в ефективността на разглежданите фармакологични агенти, нито един от тях не е утвърден като общоприето средство за терапия на разстройствата, свързани с хазарта.

Фармацевтът е първата линия за ранно разпознаване на импулсивни симптоми. Назревящата реакция може да предизвика тежки социални и функционални последици за пациента.





Клинични проучвания (n=18)	Тип изследване	Брой включени субекти	Фармакологични агенти	Резултати
Holman et al., 2009 САЩ	Ретроспективно проучване с пациентски картони	3006 пациента с фибромалгия*	допаминови агонисти	7 случая на хазартно разстройство
Weintraub et al., 2010 САЩ + Канада	Мултицентрово, cross- sectional study	3090 пациента с ПБ	Levodopa, допаминови агонисти	5% от пациентите развиват патологично хазартно поведение; по-висока честота при приложение на допаминови агонисти (17%)
Cornelius et al., 2010 САЩ	Проспективно case-control проучване	100 пациента със синдром на неспокойните крака, терапия с допаминови агонисти 327 контроли	допаминови агонисти	5-7% от пациентите със синдрома развиват хазартно разстройство; дозова зависимост за pramipexole
Bastaens et al., 2013 САЩ	Проспективно кохортно проучване (4 години)	164 пациента с ПБ	допаминови агонисти	18 пациента, лекувани с допаминов агонист, „отключват“ разстройство на контрола на импулсите, 1 от тях – хазартно разстройство
Poletti et al., 2013 Италия	Едноцентрово, cross-sectional study	805 пациента с ПБ	допаминови агонисти	3.2% от пациентите (n=26) развиват хазартно разстройство
García-Ruiz et al., 2014 Испания	Мултицентрово, cross- sectional study	322 пациента с ПБ на хронично лечение	Pramipexole (p. os), ropinirole (p. os), rotigotine (TTS)	2.8% от пациентите развиват компулсивно хазартно поведение; оралните ЛФ се свързват с по-висок риск в сравнение с TTS (42% c/y 19%)

* пациентите с фибромалгия имат необичаен допълнителен отговор на болката, която може да бъде критичен
фактор в основата на широко разпространената болка и дискомфорт (Pramipexole намалява болката и
подобрява качеството на живот при пациенти с фибромалгия, които са приемали дългосрочно опиоиди
(Walla & Thomas, 2006))

Клинични проучвания (n=18)	Тип изследване
Alman et al., 2009 АЩ	Ретроспективно проучване с пациентски картони
Weintraub et al., 2010 АЩ + Канада	Мултицентрово, cross- sectional study
Cornelius et al., 2010 АЩ	Проспективно case-control проучване
Bastaens et al., 2013 АЩ	Проспективно кохортно проучване (4 години)
Poletti et al., 2013 Италия	Едноцентрово, cross-sectional study
García-Ruiz et al., 2014 Испания	Мултицентрово, cross- sectional study

* пациентите с фибромалгия имат необичаен допълнителен отговор на болката, която може да бъде критичен
фактор в основата на широко разпространената болка и дискомфорт (Pramipexole намалява болката и
подобрява качеството на живот при пациенти с фибромалгия, които са приемали дългосрочно опиоиди
(Walla & Thomas, 2006))

