

СТАНОВИЩЕ

от Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м.
Началник на Клиника по Онкогинекология,
УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, МУ гр. Плевен

определен за член на Научно жури със Заповед № Р-109-10 от 09.01.2018 г. на Заместник-ректора на МУ – Варна и решение на Академичен съвет по протокол № 30/ 18.12.2017 г

Относно:

Дисертационен труд на д-р Георги Ганчев Хубчев, началник Акушеро-Гинекологичен комплекс гр. Русе за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Акушерство и гинекология”.

Дисертационният труд на д-р Георги Хубчев е на тема: *„Съвременно оперативно лечение на стрес инконтиненцията при жените“*

Дисертацията съдържа общо 182 страници и 199 литературни източника и е структурирана съгласно изискванията по задължителния начин, както следва: въведение, литературен обзор; цел, задачи, материал и методи, резултати от собствените проучвания, дискусия, заключение, изводи, приноси, приложения и книгопис. Същата е онагледена с 24 таблици и 29 фигури. Фигурите и таблиците са цветни, което помага за по-ясното възприемне на информацията.

С настоящото становище изразявам положителната си оценка за разработения от Д-р Георги Ганчев Хубчев дисертационен труд. Основание за моята оценка и становище са следните доводи:

- Темата за оперативното лечение на стрес инконтиненцията при жените е изключително актуална т.к. се наблюдава тенденция за увеличаване на продължителността на живота на населението в развитите страни, а от там и броят на жените след менопауза, които в действителност са най-засегнати от заболяването. Също така диагнозата и лечението остават обект на дискусии, което определя необходимостта от продължаване на изследванията в тази насока. Тези факти изискват по-специално внимание към пациентките с инконтиненция, изразяващо се в търсенето на нови техники за лечение на стрес уринарната инконтиненция, а така също и да се сравнят различните методи за лечение на заболяването.
- Представеният от дисертанта литературен обзор демонстрира много добро познаване на съществуващата информация по дискутираната тематика в исторически план и в съвременното. Данните в него са изчерпателни и са засегнати съвременните тенденции в


хирургичното лечение на стрес-инконтиненцията при жените съпоставени с тези от миналото. Изчерпателно са проучени авторите, работили по темата за инконтиненцията при жената. От литературния обзор става ясно, че не съществуват ясни критерии за оценка на резултатите от оперативно лечение на уринарна инконтиненция при жени. Целта на проучването е ясно формулирана и конкретна.

- В проучването са включени 436 пациентки със стрес-инконтиненция, на които са приложени трите хирургични метода за имплантиране на синтетични полипропиленови мидуретрални слингове, като са изследвани и резултатите от приложеното лечение. Броят на включените в дисертационния труд болни е висок, а периода през който са лекувани и наблюдавани е 10 години.
- Чрез поставените цел и задачи дисертантът се насочва към изясняване на някои недостатъчно проучени към момента в България и в световен мащаб аспекти на лечението на стрес-инконтиненцията при жената, касаещи хирургичното лечение, прогнозата и алгоритмите на поведение относно прилаганата хирургия при заболяването.
- Изтъкнато е значението и е доказана необходимостта от индивидуализиран подход при съвременното лечение на стрес-инконтиненцията при жената, което прави възможно прилагането на специфична слинг операция (TVT-R, TVT-O и TVT-Ophira) при различна по вид стрес-инконтиненция, което повлиява положително крайният ефект от лечението.
- От получените резултати са направени заключения, които са важни за практиката и бъдещото лечение на жени със стрес-инконтиненция, като тези данни дават основание на дисертанта да направи приблизителен "портрет" на средностатистическата пациентка, която се обръща за помощ по повод уринарната инконтиненция.
- Важно е заключението, което се прави в разработката, че решението за хирургично лечение на пациентките със смесен тип инконтиненция, трябва да се направи от позицията и на резултата от уродинамичното изследване. Така на пациентките със значителна хиперактивност на детрузора и капацитет на пикочния мехур по малко от 200 ml, не трябва първоначално да се изпълнява TVT операция.
- Дискутирани са различните видове приложени оперативни техники, като се изтъкват предимствата и недостатъците им при различните клинични ситуации на базата на получените резултати от лечението, проследяването на пациентките, възможността за усложнения и дългогодишния опит на дисертанта върху проблема за стрес-инконтиненцията при жената.

- Получените резултати от проучването, направените изводи, използваните методи за диагностика на стрес-инконтиненцията, прилагането на комплексен и персонализиран подход за лечение на заболяването, изтъкването, че прилагането на TVT-R, TVT-O и TVT-Ophira оперативни техники са в основата на успешното лечение на стрес инконтиненцията, дават основание на Д-р Хубчев да представи алгоритъм за диагностичен и терапевтичен подход при пациентки с уринарна инконтиненция.

В заключение считам, че представения научен труд на д-р Георги Ганчев Хубчев „*Съвременно оперативно лечение на стрес инконтиненцията при жените*” е ценен принос в областта на акушерството и гинекологията и в частност в урогинекологията и отговаря на техническите и научни критерии за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Акушерство и гинекология”.

14.01.2018 год.



Доц. д-р Чавдар Цветков, д.м.